Hoja de Datos del Tratamiento para Parejas y Personas con Clamidia (Pág. 1 de 2)

- **Clamidia** es una enfermedad transmitida sexualmente que se transmite por tener relaciones sexuales (oral, vaginal o anal) con una persona que ya la tiene. Usted pudo haber sido expuesto, pero es fácil de curar.
- Clamidia es fácilmente curada con la medicina azithromycin conocida también como Zithromax®.
- Su compañero(a) tal vez le dio azithromycin (una pastilla) o una prescripción por azithromycin. Esta medicina se la dieron a su compañero(a) por su doctor para tratarlo a usted. Si su compañero(a) le dio una prescripción, usted puede ir a la farmacia para obtenerla.

Síntomas de clamidia:
La mayoría de las personas infectadas con clamidia NO tienen síntomas. Si usted tiene síntomas podrían ser los siguientes:

- Hombres tienen dolor e inconformidad en los testículos, la parte baja del abdomen o al orinar.
- Mujeres tienen dolor al orinar, aumento de secreción vaginal, sangre vaginal entre una regla y otra, o dolor al tener relaciones sexuales.
- Cuando hay una infección en el ano, tanto hombres como mujeres, pueden tener secreciones, comezón, dolor, sangre, o dolor al ir al baño.
- Recuerde, usted no tiene que tener estos síntomas para tener clamidia. Muchas personas pueden tener y contagiar esta infección sin haber tenido ningún síntoma.

NO TOME la medicina sin primero ver a su doctor, si usted:

- Es mujer y tiene dolor en la parte baja del abdomen, dolor durante las relaciones sexuales, vómito, o fiebre.
- Es hombre y tiene fiebre, dolor o inflamación en los testículos.
- Tiene dolor e inflamación en las articulaciones (coyunturas).
- Ha tenido alguna mala reacción, ronchas, problemas para respirar, o reacción alérgica después de tomar azthromycin o otro antibiótico **Por favor consulte con su médico antes de tomar azithromicin o si tiene alergias a los antibióticos.**
- Tiene una enfermedad crónica seria como: problemas en el riñón, corazón o del hígado.
- Esta tomando actualmente otro medicamento, incluyendo medicina para la diabetes. Esta bien tomar este medicamento con medicina sin prescripción para el dolor, o resfriado y vitaminas

Si <u>algo</u> de esto es verdad, o tiene alguna pregunta, No tome azithromycin y hable con su doctor <u>lo mas pronto posible</u>, para que pueda obtener el mejor tratamiento.

Como tomar la medicina:

- Usted debe tener cuatro (4) pastillas de azithromycin. Cada pastilla es de 250 mg.
- Usted debe tomar las cuatro (4) pastillas con agua al mismo tiempo para tratar la infección.
- Usted puede tomar estas pastillas con o sin alimentos.
- NO tome antiacidos (como Tums, Rolaids, o Maalox) por una (1) hora antes o dos (2) horas después de tomar la pastilla de azithromycin.

Esta información fue desarrollada y aprobada por el departamento de Servicios de Salud de Arizona, Programa de Enfermedades Transmitidas Sexualmente (Octubre 2008).

- No comparta o regale la medicina cefixime con ninguna persona.

Hoja de Datos del Tratamiento para Parejas Sexuales y Personas con Clamidia (pag. 2 de 2)

Reacciones alérgicas*:

- Dificultad para respirar y/o presión en el pecho
- Cierre de la garganta
- Inflamación de los labios o lengua
- Ronchas (irritación de la piel que da comezón)

Efectos secundarios:
Efectos secundarios generalmente no son serios, pero pueden ser:

- Ligero malestar estomacal
- Diarrea
- Mareo
- Hongos en la vagina

***¡Si usted sufre de alguna de estas reacciones alérgicas por favor llame al 911 o vaya a emergencia inmediatamente!**

Cosas muy importantes que recordar:

- La mejor manera de tratar la infección es ver a su propio médico o ir a su clínica. Si usted no puede ir al doctor en los siguientes días, deberá tomar azithromycin.
- Si usted decide no tomar la medicina para tratar la gonorrea usted podría enfermarse seriamente.
- Mujeres posiblemente no puedan tener hijos. Si esta embarazada actualmente, es seguro tomar azithromycin, pero asegúrese de ver a su doctor para un chequeo general
- Si usted decide no tomar la medicina deberá buscar asistencia médica lo mas pronto posible.
- Es muy importante ver a un doctor lo más pronto para hacerse exámenes para otras enfermedades transmitidas sexualmente. Azithromycin no curará otras infecciones.
- No debe tener relaciones sexuales por los siguientes (7) días después de haber tomado la medicina. Si usted tiene relaciones sexuales sin condón, o con condón y el condón se rompe, durante esos siete días usted podría transmitir la infección y posiblemente volver a infectarse
- Si usted tiene otros compañeros(as) sexuales, dígales que esta siendo tratado(a) por gonorrea, para que ellos puedan hacerse una prueba también
- Si una persona ha sido infectadas con clamidia una vez es muy seguro que se contagien otra vez. Es buena idea hacerse la prueba para clamidia y otras enfermedades transmitidas sexualmente de aquí a tres(3) meses, para asegurarse de no tener otra infección.
- Los antibióticos pueden hacer que las pastillas anticonceptivas sean menos efectivas en prevenir un embarazo. Otro método alternativo para la prevención de un embarazo como el condón deberá ser utilizado por dos semanas después de tomar el medicamento, azithromycin.

Si usted tiene preguntas acerca de la medicina, clamidia, u otra enfermedad transmitida sexualmente o exámenes para enfermedades de transmisión sexual, por favor comuníquese con su medico o llame al Departamento de Servicios de Salud de Arizona: 602-364-4666.

Local provider contact information here

Esta información fue desarrollada y aprobada por el departamento de Servicios de Salud de Arizona, Programa de Enfermedades Transmitidas Sexualmente (Octubre 2008).